

Effets secondaires	Ce que vous devriez faire	Prévention
<b>Plus courants :</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fièvre, frissons, nausées et vomissements sévères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière IMMÉDIATEMENT.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maux de tête légers, perte d'appétit, perte de poids</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cela vous incommoder, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Troubles du foie, par exemple la jaunisse (coloration jaune des yeux et de la peau).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre médecin surveillera tout problème éventuel.</li> </ul>
<b>Moins courants :</b>		
Signes de réaction allergique :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Difficulté à respirer ou à avaler.</li> <li>• Douleurs dans les articulations, démangeaisons, urticaire, douleurs thoraciques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informez votre médecin ou votre infirmière IMMÉDIATEMENT si vous avez de la difficulté à respirer ou présentez tout symptôme ou réaction allergique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre médecin ou votre infirmière vous observera après chaque injection.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douleurs graves à l'estomac accompagnées de nausées et de vomissements</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière IMMÉDIATEMENT.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confusion, somnolence, hallucinations, dépression, nervosité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dès que possible.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gonflement des pieds ou du bas des jambes</li> <li>• Soif inhabituelle, douleurs dans le bas du dos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre infirmière lors de votre prochain rendez-vous ou avant, si ces symptômes vous incommode.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulcérations dans la bouche et sur les lèvres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dès que vous constatez la présence d'ulcérations dans votre bouche ou sur vos lèvres, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenez une bonne hygiène buccale. Brossez-vous les dents souvent à l'aide d'une brosse à dents souple. Évitez de manger des aliments épicés, piquants et acides.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glycémie élevée. Parmi les symptômes, citons : somnolence, sécheresse de la bouche, rougeurs au niveau de la peau, goût fruité dans la bouche, une plus grande envie d'uriner, perte d'appétit ou douleurs à l'estomac, difficultés respiratoires, soif inhabituelle ou fatigue</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dès que possible.</li> </ul>	
<b>Rares :</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maux de tête graves, saignements inhabituels ou ecchymoses, incapacité à bouger les bras et les jambes</li> <li>• Signes d'accident vasculaire cérébral, tels que des troubles de la vue, de l'élocution (trouble de la parole), de la faiblesse ou de l'engourdissement</li> <li>• Douleurs dans le bas des jambes</li> <li>• Toux soudaine, douleurs thoraciques ou signes de caillot sanguin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendez-vous directement à votre service d'urgence local ou communiquez avec votre médecin ou votre infirmière.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nausées et vomissements</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dans les plus brefs délais si les vomissements sont violents. Si vous vomissez dans l'heure qui suit la prise de comprimés antinauséux, vous pouvez prendre une autre dose.</li> </ul>	

## Précautions:

- Si vous avez la varicelle (ou si vous avez récemment été exposé à une personne qui avait cette infection), le zona, le diabète, la goutte ou des calculs rénaux, indiquez-le à votre médecin ou à votre infirmière. Vous devez également informer votre médecin ou votre infirmière si vous avez des problèmes rénaux, hépatiques ou pancréatiques.
- Votre médecin pourra vous conseiller de boire de plus grandes quantités de liquides pour assurer le bon fonctionnement de vos reins.
- NE RECEVEZ aucun vaccin sans l'approbation préalable de votre oncologue.
- Si vous souffrez du diabète, vérifiez régulièrement votre glycémie ou votre taux de sucre dans l'urine. Si vous avez besoin d'aide pour contrôler votre diabète, demandez à votre médecin.
- Informez vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament (surtout de la prednisone), notamment des médicaments en vente libre, des vitamines, des minéraux et des produits naturels.
- Votre conjoint et vous ne devriez pas envisager une grossesse pendant que vous prenez de l'asparaginase. Les contraceptifs oraux seuls peuvent ne pas être efficaces comme méthode de contraception. Il importe de discuter avec votre médecin de la meilleure méthode contraceptive à utiliser.
- Vous ne devriez pas utiliser de l'asparaginase si vous êtes enceinte ou allaitez.
- L'asparaginase peut affecter de façon permanente votre capacité à avoir des enfants dans l'avenir. Pour de plus amples renseignements, demandez à votre médecin ou à votre infirmière.

Cette fiche d'information ne contient pas tous les renseignements connus sur ce médicament.

Pour de plus amples renseignements relativement à ce médicament, veuillez communiquer avec votre médecin, pharmacien ou infirmière.

(Numéro de téléphone de votre médecin ou infirmière)

Ou téléphonez au service  
d'information de la Société canadienne  
du cancer au  
**1 888 939-3333**  
ou consultez le  
**www.cancer.ca**

Projet de collaboration du :  
Programme de thérapie générale, Cancer Care Nova Scotia  
Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick, division du ministère de  
la Santé du Nouveau-Brunswick.

Approuvée par le Nova Scotia Cancer Patient Education  
Committee  
Visitez notre site Web au : [www.cancercare.ns.ca](http://www.cancercare.ns.ca)

Droit d'auteur de la Couronne ©. Province de la Nouvelle Écosse,  
2008. Peut être réimprimée avec la permission de Cancer Care  
Nova Scotia 1 866 599-2236

Fiche d'information sur les médicaments

## **ASPARAGINASE** (as-para-gi-naze)

### Autres appellations de ce médicament :

Kidrolase<sup>MD</sup> (Marque déposée)

### Présentation:

Injection : Solution claire de couleur rouge pour injection musculaire, sous cutanée ou sanguine.

### Pourquoi devez-vous prendre ce médicament :

L'asparaginase est administrée conjointement à d'autres médicaments afin de traiter la leucémie et les lymphomes.

### Comment devez-vous prendre ce médicament :

Injection : L'asparaginase est injectée dans un muscle ou dans une veine par votre infirmière en chimiothérapie.