

Effets secondaires	Ce que vous devriez faire	Prévention
<p>Plus courants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Présence de sang dans l'urine; fièvres, frissons; besoin fréquent d'uriner, douleurs au moment d'uriner; douleurs articulaires; nausées Sensation de brûlure au moment d'uriner la première fois après le traitement symptômes semblables à une grippe quelques heures après le traitement (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires) 	<ul style="list-style-type: none"> Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dès que possible. Si ces effets secondaires persistent, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. Prenez des comprimés d'acétaminophène contre les douleurs et la fièvre. 	<ul style="list-style-type: none"> Il s'agit d'effets secondaires temporaires auxquels on doit s'attendre. Reposez-vous et buvez beaucoup de liquide.
<p>Rares :</p> <ul style="list-style-type: none"> Éruptions cutanées (membres et tronc) Toux inhabituelle Coloration jaune des yeux ou de la peau, sensation de démangeaison Respiration difficile, essoufflement, respiration sifflante ou autres signes de réaction allergique durant le traitement. 	<ul style="list-style-type: none"> Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dès que possible. Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. Rendez vous directement au service d'urgence le plus près de chez vous et communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. 	<ul style="list-style-type: none"> Votre médecin demandera des analyses sanguines pour contrôler vos fonctions hépatiques.

Précautions:

- Si vous êtes enceinte ou allaitez, informez en votre médecin ou votre infirmière.
- Si vous avez déjà eu une réaction inhabituelle ou allergique au BCG ou à un vaccin contre la tuberculose, indiquez-le à votre médecin ou à votre infirmière.
- Si vous souffrez d'autres troubles de santé, particulièrement de la fièvre, des problèmes d'immunité (ou si vous prenez des médicaments qui amoindrissent votre réaction à l'infection, comme de la prednison ou de la dexaméthasone) ou une infection urinaire, informez-en votre médecin ou votre infirmière.
- Vous devez conserver la solution dans votre vessie pendant deux heures. Pendant la première heure, on vous demandera peut-être de changer de position et de vous coucher sur le ventre pendant 15 minutes, ensuite sur le dos, puis sur chaque côté. Lorsque vous irez vider votre vessie, vous devrez vous asseoir sur la toilette pour le faire. Si vous pensez que cela peut vous poser problème, dites-le à votre médecin.
- Il importe de boire beaucoup de liquide pendant plusieurs heures après le traitement et de vider votre vessie fréquemment pour éviter les troubles de la vessie. Vous devriez vous asseoir pour vider votre vessie, et ce, chaque fois au cours des huit prochaines heures. Après chaque passage à la toilette, lavez vous les mains et les organes génitaux.
- Le BCG comporte des bactéries vivantes. Toute l'urine éliminée pendant les trois premiers jours suivant le traitement doit être désinfectée à l'aide d'une tasse de javellisant domestique (non dilué). Ajoutez le javellisant à l'urine dans la toilette et laissez agir pendant 15 minutes avant de tirer la chasse d'eau. Après chaque passage à la toilette, lavez-vous les mains soigneusement.
- VOUS NE DEVEZ PAS recevoir de vaccin ni d'épreuve cutanée contre la tuberculose sans en parler au préalable avec votre médecin ou votre infirmière. Le BCG pourrait provoquer un test de tuberculose positif, sans présence de tuberculose.

Cette fiche d'information ne contient pas tous les renseignements connus sur ce médicament.

Pour de plus amples renseignements relativement à ce médicament, veuillez communiquer avec votre médecin, pharmacien ou infirmière.

(Numéro de téléphone de votre médecin ou infirmière)

Ou téléphonez au service d'information de la Société canadienne du cancer au
1 888 939-3333
ou consultez le
www.cancer.ca

Projet de collaboration du :
Programme de thérapie générale, Cancer Care Nova Scotia
Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick, division du ministère de
la Santé du Nouveau-Brunswick.

Approuvée par le Nova Scotia Cancer Patient Education
Committee
Visitez notre site Web au : www.cancercare.ns.ca

Droit d'auteur de la Couronne ©. Province de la Nouvelle Écosse,
2008. Peut être réimprimée avec la permission de Cancer Care
Nova Scotia 1 866 599-2236

Fiche d'information sur les médicaments

INSTILLATION VÉSICALE DE BCG (Bacille Calmette Guérin)

Autres appellations de ce médicament :

Im mucyst BCG Therapeutic^{MD}, Oncotis^{MD}, Pacis^{MD}, (Marques déposées)

Présentation :

Solution laiteuse pour instillation dans la vessie.

Pourquoi devez-vous prendre ce médicament :

L'instillation de BCG est utilisée pour traiter le cancer de la vessie.

Comment devez-vous prendre ce médicament :

Ce médicament est instillé directement dans la vessie, au moyen d'un cathéter inséré par votre infirmière. Vous devez garder cette solution dans votre vessie pendant une heure ou deux, ou selon les indications de votre médecin ou de votre infirmière.

Vous ne devez pas boire de liquides pendant deux heures avant le traitement afin que votre vessie soit vide.