

Effets secondaires	Ce que vous devriez faire	Prévention
Plus courants :		
<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre et frissons (débutent souvent de trois à six heures après l'injection) 	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'acétaminophène ne parvient pas à réduire ces effets dans les 12 à 24 heures, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière le plus tôt possible. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez prendre un ou deux comprimés d'acétaminophène régulier avant chaque injection et tous les quatre à six heures par la suite, jusqu'à ce que la fièvre et les frissons disparaissent.
<ul style="list-style-type: none"> • Toux, essoufflement • Respiration difficile 	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière IMMÉDIATEMENT. Si les symptômes sont graves, rendez vous directement au service d'urgence le plus près de chez vous. 	<ul style="list-style-type: none"> • Votre médecin prendra des radiographies et examinera vos poumons lors de vos visites régulières à la clinique.
<ul style="list-style-type: none"> • Nausées, vomissements 	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière si votre médicament pour la nausée n'est pas efficace. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits contre la nausée.
<ul style="list-style-type: none"> • Ulcérations dans la bouche et sur les lèvres 	<ul style="list-style-type: none"> • Dès que vous constatez la présence d'ulcérations dans votre bouche ou sur vos lèvres, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenez une bonne hygiène buccale. Brossez vous les dents souvent à l'aide d'une brosse à dents souple. Évitez de manger des aliments épicés, piquants et acides.
<ul style="list-style-type: none"> • Coloration plus foncée ou épaissement de la peau • Éruptions cutanées 	<ul style="list-style-type: none"> • Si ces effets vous incommode, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. 	<ul style="list-style-type: none"> • Votre peau reprendra progressivement son aspect normal après la fin du traitement.
Moins courants :		
<ul style="list-style-type: none"> • Confusion, évanouissement, respiration sifflante 	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière immédiatement. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Modifications de l'apparence des ongles 	<ul style="list-style-type: none"> • Si cela vous gêne, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. 	
Rares :		
<ul style="list-style-type: none"> • Douleurs subites et aiguës à la poitrine 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendez-vous directement au service d'urgence le plus près de chez vous. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Faiblesse soudaine dans les bras et les jambes • Douleur à l'endroit de la tumeur • Gonflement et douleur dans les veines 	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière IMMÉDIATEMENT. Si les symptômes sont graves, rendez-vous directement au service d'urgence le plus près de chez vous. 	

Précautions:

- Informez vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament, notamment des médicaments en vente libre, des vitamines, des minéraux et des produits naturels.
- Si vous prenez les médicaments phénytoïne ou digoxine, dites-le à votre médecin ou votre infirmière.
- La bléomycine est un médicament chimiothérapeutique. Assurez-vous que les membres de votre famille évitent toute exposition à ce médicament s'ils doivent nettoyer vos vomissements ou si vous avez un accident d'incontinence. Votre infirmière vous remettra des directives sur la façon de protéger les personnes vivant avec vous en cas d'exposition au médicament par le biais de fluides corporels.
- Des problèmes au niveau de la fonction pulmonaire peuvent survenir des mois, ou même des années, après le traitement. Votre médecin évaluera périodiquement vos progrès afin de déceler les effets indésirables. Des radiographies thoraciques pourront être réalisées de temps à autre afin de surveiller les effets des médicaments sur vos poumons. Si vous éprouvez des troubles respiratoires, vous devez entrer en contact avec votre médecin dans les plus brefs délais.
- Le tabagisme peut également aggraver vos problèmes pulmonaires. Si vous fumez, vous devriez essayer d'arrêter.
- Si vous souffrez d'un trouble de reins, du foie ou des poumons, il est très important de le dire à votre médecin ou à votre infirmière. Si vous fumez, dites-le-lui également.
- Avant de subir une chirurgie (y compris une chirurgie dentaire), indiquez à votre médecin que vous recevez des injections de bléomycine.
- Chez certaines personnes, la bléomycine peut provoquer une perte TEMPORAIRE de cheveux. La croissance normale des cheveux devrait reprendre après le traitement, même si cela peut prendre plusieurs mois.
- Pris seul ou en combinaison avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques, ce médicament peut causer de la fatigue, occasionner une baisse de libido et de satisfaction sexuelle ainsi que des changements à toute relation intime, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.
- Votre conjoint et vous ne devriez pas envisager une grossesse pendant que vous prenez de la bléomycine. Les contraceptifs oraux seuls peuvent ne pas être efficaces comme méthode de contraception. Il importe de discuter avec votre médecin de la meilleure méthode contraceptive à utiliser.
- Vous ne devriez pas utiliser de la bléomycine si vous êtes enceinte ou allaitez.
- La bléomycine peut affecter de façon permanente votre capacité à avoir des enfants dans l'avenir. Pour de plus amples renseignements, demandez à votre médecin ou à votre infirmière.

Cette fiche d'information ne contient pas tous les renseignements connus sur ce médicament.

Pour de plus amples renseignements relativement à ce médicament, veuillez communiquer avec votre médecin, pharmacien ou infirmière.

(Numéro de téléphone de votre médecin ou infirmière)

Ou téléphonez au service d'information de la Société canadienne du cancer au
1 888 939-3333
ou consultez le
www.cancer.ca

Projet de collaboration du :
Programme de thérapie générale, Cancer Care Nova Scotia
Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick, division du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick.

Approuvée par le Nova Scotia Cancer Patient Education Committee
Visitez notre site Web au : www.cancercare.ns.ca

Droit d'auteur de la Couronne ©. Province de la Nouvelle Écosse, 2008. Peut être réimprimée avec la permission de Cancer Care Nova Scotia 1 866 599-2236

CNB 7645

Fiche d'information sur les médicaments

BLÉOMYCINE (blé-o-mi-cine)

Autres appellations de ce médicament :

Blenoxane^{MD} (Marque déposée) Autres produits génériques disponibles

Présentation :

Injection : Solution transparente pour injection dans la circulation sanguine.

Pourquoi devez-vous prendre ce médicament :

La bléomycine est administrée conjointement à d'autres médicaments afin de traiter divers types de cancer, notamment la maladie de Hodgkin, les lymphomes, les cancers de la tête et du cou, le cancer testiculaire, ou autres types de cancer.

Comment devez-vous prendre ce médicament :

Injection : Votre infirmière en chimiothérapie injectera ce médicament dans votre circulation sanguine pendant quelques minutes. Vous recevrez peut-être également une petite dose d'essai de bléomycine lors de la première journée de votre traitement, de façon à évaluer les réactions de votre organisme à ce médicament.

New Brunswick
Nouveau Brunswick