

Effets secondaires	Ce que vous devriez faire	Prévention
<p>Plus courants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perte d'énergie, faiblesse; peut être grave • Vertige, baisse de tension artérielle 	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dans les plus brefs délais si les symptômes sont graves. Pour des symptômes moins graves, entrez en contact avec votre médecin ou votre infirmière si celle-ci persiste au-delà de 24 à 48 heures ou si vous vous sentez faible. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reposez-vous beaucoup. Planifiez vos activités en tenant compte de votre manque d'énergie. • Votre médecin vérifiera votre tension artérielle lors de vos visites régulières.
<ul style="list-style-type: none"> • Engourdissements, picotement dans les doigts, douleurs aux articulations et aux muscles • Perte de force dans les mains, les bras et les jambes 	<ul style="list-style-type: none"> • Si cela vous incommoder, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Constipation 	<ul style="list-style-type: none"> • Faites l'essai des laxatifs naturels ou vendus sans ordonnance afin de régulariser vos selles. Demandez des conseils à votre médecin, à votre infirmière ou à votre pharmacien si vous n'avez pas eu de selles pendant deux à trois jours. Si ces symptômes persistent, parlez-en à votre médecin ou votre infirmière lors de votre prochaine visite. 	<ul style="list-style-type: none"> • Favorisez une diète à haute teneur en fibres contenant des grains entiers, des fruits et des légumes crus. Faites des exercices légers quotidiens. Buvez beaucoup de liquides.
<ul style="list-style-type: none"> • Perte d'appétit • Douleurs aux articulations, aux os, aux muscles ou au dos. • Mal de tête • Fatigue • Sensation de grippe, fièvre et frissons 	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous présentez l'un de ces effets secondaires, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. Si les symptômes sont soudains ou graves, rendez-vous directement au service d'urgence le plus près de chez vous. 	
<p>Moins courants :</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Coagulation sanguine à l'intérieur du corps, douleurs aux bras ou aux jambes, difficulté soudaine à respirer • Enflure sévère du visage, des bras, des jambes ou autres régions du corps 	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous présentez l'un de ces effets secondaires, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. Si les symptômes sont graves, rendez-vous directement au service d'urgence le plus près de chez vous. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Dysérection chez les hommes 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre infirmière lors de votre prochain rendez-vous ou avant, si ces symptômes vous incommode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous prévoyez de fonder une famille dans l'avenir, envisagez les banques de sperme.
<ul style="list-style-type: none"> • Diarrhée 	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquez immédiatement avec votre médecin ou votre infirmière en cas de symptômes graves. Pour une diarrhée moins grave, entrez en contact avec votre médecin ou votre infirmière si celle-ci persiste au-delà de 24 à 48 heures ou si vous vous sentez faible. Assurez-vous de boire beaucoup de liquides. 	<ul style="list-style-type: none"> • Évitez de manger des aliments épicés, piquants et frits; évitez les aliments et boissons contenant de la caféine. • Évitez de manger des aliments riches en fibres, comme du son, des noix, des fruits et des légumes.

Précautions:

- Il est important de l'indiquer à votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, notamment des médicaments en vente libre, des produits naturels et des vitamines. Le bortézomib est transformé par le foie et est très sensible aux autres médicaments pouvant influencer sur les enzymes hépatiques.
- Le pamplemousse, ou certains médicaments comme le kétoconazole, l'érythromycine, la clarithromycine, peuvent accroître l'effet du bortézomib. D'autres médicaments également, comme la dexaméthasone, la phénytoïne, le phénobarbital ou autres médicaments destinés à abaisser le cholestérol. Un bon nombre d'autres médicaments peuvent interagir avec le bortézomib, notamment des médicaments en vente libre, des produits naturels et des vitamines.
- Éviter tout autre médicament reconnu pour causer une neuropathie périphérique (p. ex. amiodarone, agents antiviraux, isoniazide, nitrofurantoïne, statines) ou une diminution de la tension artérielle.
- Faites part à votre médecin de TOUS les autres médicaments que vous prenez en même temps que le bortézomib.
- Pris seul ou en combinaison avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques, ce médicament peut causer de la fatigue, occasionner une baisse de libido et de satisfaction sexuelle ainsi que des changements à toute relation intime, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.
- Votre conjoint et vous ne devriez pas envisager une grossesse pendant que vous prenez du bortézomib. Les contraceptifs oraux seuls peuvent ne pas être efficaces comme méthode de contraception. Il importe de discuter avec votre médecin de la meilleure méthode contraceptive à utiliser.
- Vous ne devriez pas utiliser du bortézomib si vous êtes enceinte ou allaitez.
- Le bortézomib est un médicament chimiothérapeutique. Assurez vous que les membres de votre famille évitent toute exposition à ce médicament s'ils doivent nettoyer vos vomissements ou si vous avez un accident d'incontinence. Votre infirmière vous remettra des directives sur la façon de protéger les personnes vivant avec vous en cas d'exposition au médicament par le biais de fluides corporels.

Cette fiche d'information ne contient pas tous les renseignements connus sur ce médicament.

Pour de plus amples renseignements relativement à ce médicament, veuillez communiquer avec votre médecin, pharmacien ou infirmière.

(Numéro de téléphone de votre médecin ou infirmière)

Ou téléphonez au service d'information de la Société canadienne du cancer au
1 888 939-3333
ou consultez le
www.cancer.ca

Projet de collaboration de :
Programme de thérapie générale, Cancer Care Nova Scotia
Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick, division du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick.

Approuvée par le Nova Scotia Cancer Patient Education Committee
Visitez notre site Web au : www.cancercare.ns.ca

Droit d'auteur de la Couronne ©. Province de la Nouvelle Écosse, 2008. Peut être réimprimée avec la permission de Cancer Care Nova Scotia 1 866 599-2236

Fiche d'information sur les médicaments

BORTÉZOMIB **(bor-té-zo-mib)**

Autres appellations de ce médicament :

Velcade^{MD} (Marque déposée)

Présentation :

Injection : Fliale contenant 3,5 mg de bortézomib.

Pourquoi devez-vous prendre ce médicament :

Le bortézomib est administré pour traiter les myélomes multiples.

Comment devez-vous prendre ce médicament :

Injection : Votre infirmière en chimiothérapie injectera ce médicament dans votre circulation sanguine pendant quelques minutes.