

| Effets secondaires | Ce que vous devriez faire | Prévention |
|---|---|---|
| Plus courants : | <ul style="list-style-type: none"> • Si les saignements ou ecchymoses sont inhabituels ou ne cessent pas, communiquez immédiatement avec votre médecin ou votre infirmière ou rendez vous directement à votre service d'urgence local. • Ne prenez pas d'ASA (Aspirin^{MD}), utilisez plutôt de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}). | <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez avec soin les objets tranchants. Servez vous d'une brosse à dents souple. Faites attention en vous rasant. Parlez à votre médecin avant de subir toute intervention dentaire. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Signes d'infection, de fièvre, frissons, toux • Baisse du nombre de globules blancs | <ul style="list-style-type: none"> • Ayez un thermomètre à la maison. Reconnaissez les signes d'infection. • Rendez-vous directement à votre service d'urgence le plus près si votre température est supérieure à 38 °C ou 100 °F. Vous pourriez avoir une infection et nécessiter des antibiotiques. | <ul style="list-style-type: none"> • Limitez tout contact avec les personnes malades ou atteintes d'un rhume. Reposez vous souvent. Lavez vous souvent les mains. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nausées et vomissements | <ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dans les plus brefs délais si les vomissements sont violents. • Si vous vomissez moins d'une heure après avoir pris des comprimés antinauséux, vous pouvez prendre une autre dose. Si vous ne pouvez garder les comprimés, un suppositoire peut vous être prescrit. | <ul style="list-style-type: none"> • Votre médecin peut vous prescrire des médicaments contre les nausées et les vomissements. Continuez de boire des liquides clairs. Prenez de l'air et reposez-vous. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fatigue ou faiblesse • Signes d'anémie Faibles niveaux d'hémoglobine | <ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière aussitôt que possible si cela vous incommod. Sinon, dites le à votre médecin ou à votre infirmière lors de votre prochaine visite. | <ul style="list-style-type: none"> • Reposez vous lorsque vous vous sentez fatigué ou faible. Ne conduisez pas de véhicule motorisé et ne manœuvrez pas de machines. Mangez des repas équilibrés. |
| Moins courants : | <ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière IMMÉDIATEMENT. | <ul style="list-style-type: none"> • Buvez huit grands verres de liquide par jour. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Difficultés à uriner • Constipation | <ul style="list-style-type: none"> • Faites l'essai des laxatifs naturels ou vendus sans ordonnance afin de régulariser vos selles. Demandez des conseils à votre médecin, à votre infirmière ou à votre pharmacien si vous n'avez pas eu de selles pendant deux à trois jours. | <ul style="list-style-type: none"> • Favorisez une diète à haute teneur en fibres contenant des grains entiers, des fruits et des légumes crus. Faites des exercices légers quotidiens. Buvez beaucoup de liquides. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Diarrhée | <ul style="list-style-type: none"> • Communiquez immédiatement avec votre médecin ou votre infirmière dans les plus brefs délais en cas de symptômes graves. Pour une diarrhée moins grave, entrez en contact avec votre médecin ou votre infirmière si celle ci persiste au delà de 24 à 48 heures ou si vous vous sentez faible. Assurez vous de boire beaucoup de liquides. | <ul style="list-style-type: none"> • Évitez de manger des aliments épicés, piquants et frits; évitez les aliments et boissons contenant de la caféine. • Évitez de manger des aliments riches en fibres, comme du son, des noix, des fruits et des légumes. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perte d'appétit | <ul style="list-style-type: none"> • Un plan de repas à haute teneur calorique est recommandé lorsque vous ne mangez pas beaucoup. • Consultez votre diététiste pour plus de renseignements. | <ul style="list-style-type: none"> • Prenez plusieurs petits repas par jour. Mangez tranquillement. Des exercices légers et de l'air frais sont bénéfiques. Buvez beaucoup de liquides. |
| Rares : | <ul style="list-style-type: none"> • Rendez vous directement à votre service d'urgence local ou communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. • Vos cheveux repousseront après la fin de vos traitements. • Vous pouvez porter une perruque, un chapeau, une casquette, une écharpe ou un postiche (toupet). • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dès que possible. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Convulsions • Perte des cheveux et des poils du corps • Difficulté à marcher, insensibilisation ou picotements dans les doigts et les orteils | | |

Précautions:

- Buvez beaucoup de liquides. La consommation de huit verres de liquides par jour est recommandée.
- En raison du risque accru d'infection, vérifiez auprès de votre médecin ou de votre infirmière avant de recevoir tout vaccin.
- Informez-vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament, notamment des médicaments en vente libre, des vitamines, des minéraux et des produits naturels.
- La carboplatine est un médicament chimiothérapeutique. Assurez-vous que les membres de votre famille évitent toute exposition à ce médicament s'ils doivent nettoyer vos vomissements ou si vous avez un accident d'incontinence. Votre infirmière vous remettra des directives sur la façon de protéger les personnes vivant avec vous en cas d'exposition au médicament par le biais de fluides corporels.
- Les néphropathies ou les troubles de l'ouïe peuvent s'aggraver en prenant de la carboplatine. Si vous avez déjà souffert de troubles rénaux ou de l'audition, avisez votre médecin ou votre infirmière.
- Il importe d'indiquer à votre médecin ou à votre infirmière si vous avez la varicelle (ou avez récemment été en contact avec une personne qui avait la varicelle), le zona, la goutte ou des calculs rénaux. Toutes ces situations pourraient influencer sur le traitement à la carboplatine.
- Si un médecin vous a conseillé de prendre de l'ASA (Aspirin^{MD}) afin de prévenir une maladie cardiaque ou les accidents vasculaires cérébraux, dites-le à votre oncologue avant d'entamer votre traitement contre le cancer. Autrement, NE PRENEZ PAS d'ASA pour soulager des douleurs et des maux quotidiens durant le traitement de chimiothérapie, prenez plutôt des produits contenant de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}). (Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien si l'un de vos produits comporte de l'ASA ou de l'acétaminophène.)
- Pris seul ou en combinaison avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques, ce médicament peut causer de la fatigue, occasionner une baisse de libido et de satisfaction sexuelle ainsi que des changements à toute relation intime, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.
- Votre conjoint et vous ne devriez pas envisager une grossesse pendant que vous prenez de la carboplatine. Les contraceptifs oraux seuls peuvent ne pas être efficaces comme méthode de contraception. Il importe de discuter avec votre médecin de la meilleure méthode contraceptive à utiliser.
- Vous ne devriez pas utiliser de la carboplatine si vous êtes enceinte ou allaitez.
- La carboplatine peut provoquer des changements permanents à votre cycle menstruel et à votre capacité à avoir des enfants dans l'avenir. Pour de plus amples renseignements, demandez à votre médecin ou à votre infirmière.

Cette fiche d'information ne contient pas tous les renseignements connus sur ce médicament.

Pour de plus amples renseignements relativement à ce médicament, veuillez communiquer avec votre médecin, pharmacien ou infirmière.

(Numéro de téléphone de votre médecin ou infirmière)

Ou téléphonez au service
d'information de la Société canadienne
du cancer au
1 888 939-3333
ou consultez le
www.cancer.ca

Projet de collaboration du :
Programme de thérapie générale, Cancer Care Nova Scotia
Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick, division du ministère de
la Santé du Nouveau-Brunswick.

Approuvée par le Nova Scotia Cancer Patient Education
Committee

Visitez notre site Web au : www.cancercare.ns.ca

Droit d'auteur de la Couronne ©. Province de la Nouvelle Écosse,
2008. Peut être réimprimée avec la permission de Cancer Care
Nova Scotia 1 866 599-2236

Fiche d'information sur les médicaments

CARBOPLATINE (kar-bo-pla-tine)

Autres appellations de ce médicament :

Paraplatin^{MD} (Marque déposée) Autres produits génériques disponibles

Présentation :

Injection : Solution transparente pour injection dans la circulation sanguine.

Pourquoi devez-vous prendre ce médicament :

Ce médicament est administré principalement pour le traitement du cancer ovarien. Il est parfois administré contre le cancer du cerveau, du poumon ou des testicules. On peut également l'administrer pour traiter d'autres types de cancer.

Comment devez-vous prendre ce médicament :

Injection : Votre infirmière en chimiothérapie injectera ce médicament dans votre circulation sanguine pendant une période de 30 à 60 minutes.