

Effets secondaires	Ce que vous devriez faire	Prévention
<p>Plus courants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signes d'infection, de fièvre, frissons, toux • Baisse du nombre de globules blancs • Dyspnée (souffle court) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Respiration difficile • Nausées et vomissements <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Étourdissements, perte de coordination <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Douleurs abdominales • Ecchymoses ou saignements <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Selles noires semblables à du goudron • Rougeurs sur la peau • Faible numération plaquettaire • Douleur ou rougeurs près du site d'injection 	<ul style="list-style-type: none"> • Ayez un thermomètre à la maison. Reconnaissez les signes d'infection. • Rendez-vous directement à votre service d'urgence le plus près si votre température est supérieure à 38 °C ou 100 °F. Vous pourriez avoir une infection et nécessiter des antibiotiques. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière IMMÉDIATEMENT. Si les symptômes sont graves, rendez vous directement au service d'urgence le plus près de chez vous. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dans les plus brefs délais si les vomissements sont violents. • Si vous vomissez moins d'une heure après avoir pris des comprimés antinauséux, vous pouvez prendre une autre dose. Si vous ne pouvez garder les comprimés, un suppositoire peut vous être prescrit. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dès que possible. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Si les saignements ou ecchymoses sont inhabituels ou ne cessent pas, communiquez immédiatement avec votre médecin ou votre infirmière ou rendez vous directement à votre service d'urgence local. • Ne prenez pas d'ASA (Aspirin^{MD}), utilisez plutôt de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}). • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière immédiatement si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort tandis que vous êtes à l'hôpital ou à la clinique. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limitez tout contact avec les personnes malades ou atteintes d'un rhume. Reposez vous souvent. Lavez vous souvent les mains. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Votre médecin prendra des radiographies et écoutera vos poumons lors de vos visites régulières à la clinique. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Votre médecin peut vous prescrire des médicaments contre les nausées et les vomissements. Continuez de boire des liquides clairs. Prenez de l'air et reposez-vous. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez avec soin les objets tranchants. Servez vous d'une brosse à dents souple. Faites attention en vous rasant. Parlez à votre médecin avant de subir toute intervention dentaire.
<p>Moins courants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulcérations dans la bouche et sur les lèvres <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Éruptions cutanées, rougissement du visage • Décoloration à l'endroit de l'injection • Fatigue inhabituelle <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Diarrhée <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Faiblesses • Constipation <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Perte des cheveux et des poils du corps 	<ul style="list-style-type: none"> • Dès que vous constatez la présence d'ulcérations dans votre bouche ou sur vos lèvres, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dès que possible. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dans les plus brefs délais si les symptômes sont sévères. Pour une diarrhée moins grave, entrez en contact avec votre médecin ou votre infirmière si celle ci persiste au delà de 24 à 48 heures ou si vous vous sentez faible. Assurez vous de boire beaucoup de liquides. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Si cela vous incommode, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. • Vous pouvez porter une perruque, un chapeau, une casquette, une écharpe ou un postiche (toupet). <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Vos cheveux repousseront après la fin de vos traitements. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenez une bonne hygiène buccale. Brossez vous les dents souvent à l'aide d'une brosse à dents souple. Évitez de manger des aliments épicés, piquants et acides. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Évitez de manger des aliments épicés, piquants et frits; évitez les aliments et boissons avec de la caféine. • Évitez de manger des aliments riches en fibres, comme du son, des noix, des fruits et des légumes.
<p>Rares :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diminution de la quantité d'urine 	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dès que possible. 	

Précautions:

- Si vous prenez d'autres médicaments comme de la cimétidine, de la digoxine ou de la phénytoïne, avisez votre médecin ou votre infirmière.
- Informez vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament, notamment des médicaments en vente libre, des vitamines, des minéraux et des produits naturels.
- La carmustine est un médicament chimiothérapeutique. Assurez vous que les membres de votre famille évitent toute exposition à ce médicament s'ils doivent nettoyer vos vomissements ou si vous avez un accident d'incontinence. Votre infirmière vous remettra des directives sur la façon de protéger les personnes vivant avec vous en cas d'exposition au médicament par le biais de fluides corporels.
- Il importe d'indiquer à votre médecin ou à votre infirmière si vous avez la varicelle (ou avez récemment été en contact avec une personne qui avait la varicelle), le zona, une infection, une maladie rénale, une maladie du foie ou une maladie pulmonaire. Toutes ces situations pourraient influencer sur le traitement à la carmustine.
- La carmustine peut provoquer des troubles pulmonaires graves. Ces troubles peuvent s'aggraver si vous fumez. Vous devriez cesser de fumer.
- Consultez votre médecin ou votre infirmière si vous avez besoin de vaccins.
- Il est important de boire au moins deux à trois litres (pintes) de liquides chaque jour, à moins d'indications contraires de votre médecin ou infirmière.
- Informez vous auprès de votre médecin ou de votre infirmière sur les soins de la bouche, le choix de la brosse à dents et le fil de soie dentaire. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre infirmière avant de subir toute intervention dentaire.
- La carmustine peut occasionner une perte de cheveux temporaire.
- La carmustine peut être irritante pour la peau.
- Pris seul ou en combinaison avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques, ce médicament peut causer de la fatigue, occasionner une baisse de libido et de satisfaction sexuelle ainsi que des changements à toute relation intime, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.
- Votre conjoint et vous ne devriez pas envisager une grossesse pendant que vous prenez de la carmustine. Les contraceptifs oraux seuls peuvent ne pas être efficaces comme méthode de contraception. Il importe de discuter avec votre médecin de la meilleure méthode contraceptive à utiliser.
- Vous ne devriez pas utiliser de la carmustine si vous êtes enceinte ou allaitez.
- Le carmustine peut provoquer des changements permanents à votre cycle menstruel et à votre capacité à avoir des enfants dans l'avenir. Pour de plus amples renseignements, demandez à votre médecin ou à votre infirmière.

Cette fiche d'information ne contient pas tous les renseignements connus sur ce médicament.

Pour de plus amples renseignements relativement à ce médicament, veuillez communiquer avec votre médecin, pharmacien ou infirmière.

(Numéro de téléphone de votre médecin ou infirmière)

Ou téléphonez au service d'information de la Société canadienne du cancer au
1 888 939-3333
ou consultez le
www.cancer.ca

Projet de collaboration du :
Programme de thérapie générale, Cancer Care Nova Scotia
Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick, division du ministère de
la Santé du Nouveau-Brunswick.

Approuvée par le Nova Scotia Cancer Patient Education
Committee
Visitez notre site Web au : www.cancercare.ns.ca

Droit d'auteur de la Couronne ©. Province de la Nouvelle Écosse,
2008. Peut être réimprimée avec la permission de Cancer Care
Nova Scotia 1 866 599-2236

CNB 7645

Fiche d'information sur les médicaments

CARMUSTINE (kar-mus-tine)

Autres appellations de ce médicament :

BicNU^{MD} (Marque déposée)

Présentation :

Injection : Solution transparente pour injection dans la circulation sanguine.

Pourquoi devez-vous prendre ce médicament :

La carmustine est administrée en association avec d'autres médicaments pour traiter les tumeurs au cerveau, le myélome, certains lymphomes et les mélanomes.

Comment devez-vous prendre ce médicament :

Injection : Votre infirmière en chimiothérapie injectera ce médicament dans votre circulation sanguine pendant une période d'une à deux heures.

New Brunswick
Nouveau Brunswick