

Effets secondaires	Ce que vous devriez faire	Prévention
<p><b>Plus courants :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signes d'infection, de fièvre, frissons, toux</li> <li>• Baisse du nombre de globules blancs</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nausées et vomissements</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Douleurs aux articulations, perte d'équilibre</li> <li>• Acouphènes, perte auditive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayez un thermomètre à la maison. Reconnaissez les signes d'infection.</li> <li>• Rendez vous directement à votre service d'urgence le plus près si votre température est supérieure à 38 °C ou 100 °F. Vous pourriez avoir une infection et nécessiter des antibiotiques.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dans les plus brefs délais si les vomissements sont violents.</li> <li>• Si vous vomissez moins d'une heure après avoir pris des comprimés antinauséux, vous pouvez prendre une autre dose. Si vous ne pouvez garder les comprimés, un suppositoire peut vous être prescrit.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dès que possible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitez tout contact avec les personnes malades ou atteintes d'un rhume. Reposez vous souvent. Lavez vous souvent les mains.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre médecin peut vous prescrire des médicaments contre les nausées et les vomissements. Continuez de boire des liquides clairs. Prenez de l'air et reposez-vous.</li> </ul>
<p><b>Moins courants :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecchymoses ou saignements</li> <li>• Selles noires semblables à du goudron</li> <li>• Rougeurs sur la peau</li> <li>• Faible numérotation plaquettaire</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatigue ou faiblesse</li> <li>• Signes d'anémie. Faibles niveaux d'hémoglobine</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Difficultés à uriner</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perte des réflexes, difficulté à marcher</li> <li>• Engourdissement ou fourmillement dans les doigts et les orteils</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dysérection chez les hommes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si les saignements ou ecchymoses sont inhabituels ou ne cessent pas, communiquez immédiatement avec votre médecin ou votre infirmière ou rendez vous directement à votre service d'urgence local.</li> <li>• Ne prenez pas d'ASA (Aspirin<sup>MD</sup>), utilisez plutôt de l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>).</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière aussitôt que possible si cela vous incommode. Sinon, dites le à votre médecin ou à votre infirmière lors de votre prochaine visite.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière IMMÉDIATEMENT.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière IMMÉDIATEMENT.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre infirmière lors de votre prochain rendez vous ou avant, si ces symptômes vous incommode.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez avec soin les objets tranchants. Servez vous d'une brosse à dents souple. Faites attention en vous rasant. Parlez à votre médecin avant de subir toute intervention dentaire.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reposez vous lorsque vous vous sentez fatigué ou faible. Ne conduisez pas un véhicule motorisé et ne manœuvrez pas de machines. Mangez des repas équilibrés.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buvez huit grands verres de liquides par jour.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous prévoyez de fonder une famille dans l'avenir, envisagez les banques de sperme.</li> </ul>
<p><b>Rares :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agitation, confusion, troubles de la vue</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signes d'une réaction allergique peu après le traitement</li> <li>• Difficulté à respirer, essoufflement, éruptions cutanées, enflure du visage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dès que possible.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informez votre médecin ou votre infirmière immédiatement si vous présentez ces symptômes tandis que vous êtes à l'hôpital ou à la clinique.</li> <li>• Si les symptômes apparaissent tandis que vous êtes loin de l'hôpital ou de la clinique, rendez vous au service d'urgence le plus près de chez vous.</li> </ul>	

## Précautions:

- Si vous prenez de la phénytoïne, du furosémide ou du lithium, il est important d'en parler à votre médecin avant de commencer le traitement à la cisplatine. Informez votre médecin ou votre pharmacien de tous les médicaments que vous prenez, notamment les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits naturels.
- La cisplatine est un médicament chimiothérapeutique. Assurez-vous que les membres de votre famille évitent toute exposition à ce médicament s'ils doivent nettoyer vos vomissements ou si vous avez un accident d'incontinence. Votre infirmière vous remettra des directives sur la façon de protéger les personnes vivant avec vous en cas d'exposition au médicament par le biais de fluides corporels.
- Les troubles du rein ou de l'ouïe peuvent s'aggraver en prenant de la cisplatine. Si vous avez déjà souffert de troubles du rein ou de l'ouïe, avisez votre médecin.
- Il importe d'indiquer à votre médecin si vous avez la varicelle (ou avez récemment été en contact avec une personne qui avait la varicelle), le zona, la goutte ou des calculs rénaux. Toutes ces situations pourraient influencer sur le traitement à la cisplatine.
- Lors de chaque visite chez le médecin ou le dentiste, informez-le que vous prenez de la cisplatine avant de recevoir une chirurgie (y compris une chirurgie dentaire), des vaccins ou un traitement en décolant.
- Si un médecin vous a conseillé de prendre de l'ASA (Aspirin<sup>MD</sup>) afin de prévenir une maladie cardiaque ou les accidents vasculaires cérébraux, dites-le à votre oncologue avant d'entamer votre traitement contre le cancer. Autrement, NE PRENEZ PAS d'ASA pour soulager des douleurs et des maux quotidiens durant le traitement de chimiothérapie, prenez plutôt des produits contenant de l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>). (Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien si vos produits comportent de l'ASA ou de l'acétaminophène.)
- Pris seul ou en combinaison avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques, ce médicament peut causer de la fatigue, occasionner une baisse de libido et de satisfaction sexuelle ainsi que des changements à toute relation intime, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.
- Votre conjoint et vous ne devriez pas envisager la grossesse pendant que vous prenez de la cisplatine. Les contraceptifs oraux seuls peuvent ne pas être efficaces comme méthode de contraception. Il importe de discuter avec votre médecin de la meilleure méthode contraceptive à utiliser.
- Vous ne devriez pas utiliser de la cisplatine si vous êtes enceinte ou allaitez.
- La cisplatine peut provoquer des changements permanents à votre cycle menstruel et votre capacité à avoir des enfants dans l'avenir. Pour de plus amples renseignements, demandez à votre médecin ou à votre infirmière.

Cette fiche d'information ne contient pas tous les renseignements connus sur ce médicament.

Pour de plus amples renseignements relativement à ce médicament, veuillez communiquer avec votre médecin, pharmacien ou infirmière.

(Numéro de téléphone de votre médecin ou infirmière)

Ou téléphonez au service  
d'information de la Société canadienne  
du cancer au  
**1 888 939-3333**  
ou consultez le  
**www.cancer.ca**

Projet de collaboration du :  
Programme de thérapie générale, Cancer Care Nova Scotia  
Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick, division du ministère de  
la Santé du Nouveau-Brunswick.

Approuvée par le Nova Scotia Cancer Patient Education  
Committee  
Visitez notre site Web au : [www.cancercare.ns.ca](http://www.cancercare.ns.ca)

Droit d'auteur de la Couronne ©. Province de la Nouvelle Écosse,  
2008. Peut être réimprimée avec la permission de Cancer Care  
Nova Scotia 1 866 599-2236

Fiche d'information sur les médicaments

## CISPLATINE (sis-pla-tine)

### Autres appellations de ce médicament :

Platino<sup>MD</sup> (Marque déposée)

Autres produits génériques disponibles

CDDP (Autre appellation)

### Présentation :

Injection : Solution transparente pour injection dans la circulation sanguine.

### Pourquoi devez-vous prendre ce médicament :

La cisplatine est administrée seule ou en combinaison avec d'autres médicaments pour traiter le cancer du col de l'utérus, des ovaires, des poumons, de l'estomac et de la vessie. On peut également l'administrer pour traiter d'autres types de cancer.

### Comment devez-vous prendre ce médicament :

Injection : Votre infirmière en chimiothérapie injectera ce médicament dans votre circulation sanguine pendant une période de 30 minutes à deux heures. Il est également possible que l'on vous administre des liquides intraveineux supplémentaires avant et après la chimiothérapie ou on pourrait vous demander de boire plus de liquides avant et après la chimiothérapie.

New Brunswick  
Nouveau Brunswick