

| Effets secondaires   | Ce que vous devriez faire   | Prévention   |
|--|---|--|
| <b>Plus courants :</b>   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signes d'infection, de fièvre, frissons, toux</li> <li>• Baisse du nombre de globules blancs</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayez un thermomètre à la maison. Reconnaissez les signes d'infection.</li> <li>• Rendez-vous directement à votre service d'urgence le plus près si votre température est supérieure à 38 °C ou 100 °F. Vous pourriez avoir une infection et nécessiter des antibiotiques</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitez tout contact avec les personnes malades ou atteintes d'un rhume. Reposez vous souvent. Lavez vous souvent les mains.</li> </ul>                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Étourdissements, confusion, agitation</li> <li>• Irrégularité menstruelle</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin dès que possible.</li> </ul>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatigue ou faiblesse</li> <li>• Signes d'anémie. Faibles niveaux d'hémoglobine</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière aussitôt que possible si cela vous incommod. Sinon, dites le à votre médecin ou à votre infirmière lors de votre prochaine visite.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reposez vous lorsque vous vous sentez fatigué ou faible. Ne conduisez pas de véhicule motorisé et ne manœuvrez pas de machines. Mangez des repas équilibrés.</li> </ul>       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nausées et vomissements</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dans les plus brefs délais si les vomissements sont violents.</li> <li>• Si vous vomissez moins d'une heure après avoir pris des comprimés antinauséux, vous pouvez prendre une autre dose. Si vous ne pouvez garder les comprimés, un suppositoire peut vous être prescrit.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre médecin peut vous prescrire des médicaments contre les nausées et les vomissements. Continuez de boire des liquides clairs. Prenez de l'air et reposez-vous.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perte des cheveux et des poils du corps</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez porter une perruque, un chapeau, une casquette, une écharpe ou un postiche (toupet).</li> <li>• Vos cheveux repousseront après la fin de vos traitements.</li> </ul>   |  |
| <b>Moins courants :</b>  |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accélération du rythme cardiaque, essoufflements, gonflement des pieds ou des jambes</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière IMMÉDIATEMENT. Si les symptômes sont graves, rendez vous directement au service d'urgence le plus près de chez vous.</li> </ul>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Douleurs à la vessie</li> <li>• Présence de sang dans l'urine</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre infirmière lors de votre prochain rendez vous ou avant, si ces symptômes vous incommode.</li> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière immédiatement si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort tandis que vous êtes à l'hôpital ou à la clinique.</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buvez beaucoup de liquides (au moins huit tasses par jour les jours de traitement).</li> <li>• Videz souvent votre vessie.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarrhée, douleurs à l'estomac</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière dans les plus brefs délais en cas de symptômes graves. Pour une diarrhée moins grave, entrez en contact avec votre médecin ou votre infirmière si celle ci persiste au delà de 24 à 48 heures ou si vous vous sentez faible. Assurez vous de boire beaucoup de liquides.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Évitez de manger des aliments riches en fibres, comme du son, des noix, des fruits et des légumes.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urticaire, prurit; réaction cutanée sur le site de l'irradiation</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cela vous incommod, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière.</li> </ul>  |  |
| <b>Rares :</b>   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloration jaune des yeux ou de la peau</li> <li>• Soif inhabituelle</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre infirmière lors de votre prochain rendez vous ou avant si ces symptômes vous incommode.</li> </ul>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dès que vous constatez la présence d'ulcérations dans votre bouche ou sur vos lèvres, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenez une bonne hygiène buccale. Servez vous d'une brosse à dents souple. Évitez de manger des aliments épicés, piquants et acides.</li> </ul>                            |

## Précautions:

- Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament (comme la digoxine, le phénobarbital, la phénytoïne ou la warfarine), notamment des médicaments en vente libre, des vitamines, des minéraux et des produits naturels.
- Si un médecin vous a conseillé de prendre de l'ASA (Aspirin<sup>MD</sup>) afin de prévenir une maladie cardiaque ou les accidents vasculaires cérébraux, dites-le à votre oncologue avant d'entamer votre traitement contre le cancer. Autrement, NE PRENEZ PAS d'ASA pour soulager des douleurs et des maux quotidiens durant le traitement de chimiothérapie, prenez plutôt des produits contenant de l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>). (Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien si un de vos produits comporte de l'ASA ou de l'acétaminophène.)
- En raison du risque accru d'infection, communiquez avec votre médecin avant de recevoir tout vaccin.
- Avant de subir une chirurgie, y compris une chirurgie dentaire, assurez vous de dire à votre médecin ou à votre dentiste que vous prenez de la cyclophosphamide.
- Il importe d'indiquer à votre médecin si vous avez la varicelle (ou avez récemment été en contact avec une personne qui avait la varicelle), le zona, le diabète, la goutte, une maladie rénale ou une maladie du foie. Toutes ces situations pourraient influencer sur votre traitement à l'aide de ce médicament.
- Pris seul ou en combinaison avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques, ce médicament peut causer de la fatigue, occasionner une baisse de libido et de satisfaction sexuelle ainsi que des changements à toute relation intime, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.
- Votre conjoint et vous ne devriez pas envisager une grossesse pendant que vous prenez de la cyclophosphamide. Les contraceptifs oraux seuls peuvent ne pas être efficaces comme méthode de contraception. Il importe de discuter avec votre médecin de la meilleure méthode contraceptive à utiliser.
- Vous ne devriez pas utiliser de la cyclophosphamide si vous êtes enceinte ou allaitez.
- La cyclophosphamide peut provoquer des changements importants à votre cycle menstruel et à votre capacité à avoir des enfants dans l'avenir. Pour de plus amples renseignements, demandez à votre médecin ou à votre infirmière.
- La cyclophosphamide est un médicament chimiothérapeutique. Assurez vous que les membres de votre famille évitent toute exposition à ce médicament s'ils doivent nettoyer vos vomissements ou si vous avez un accident d'incontinence. Votre infirmière vous remettra des directives sur la façon de protéger les personnes vivant avec vous en cas d'exposition au médicament par le biais de fluides corporels.

Cette fiche d'information ne contient pas tous les renseignements connus sur ce médicament.

Pour de plus amples renseignements relativement à ce médicament, veuillez communiquer avec votre médecin, pharmacien ou infirmière.

(Numéro de téléphone de votre médecin ou infirmière)

Ou téléphonez au service  
d'information de la Société canadienne  
du cancer au  
**1 888 939-3333**  
ou consultez le  
**www.cancer.ca**

Projet de collaboration du :  
Programme de thérapie générale, Cancer Care Nova Scotia  
Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick, division du ministère de  
la Santé du Nouveau-Brunswick.

Approuvée par le Nova Scotia Cancer Patient Education  
Committee  
Visitez notre site Web au : [www.cancercare.ns.ca](http://www.cancercare.ns.ca)

Droit d'auteur de la Couronne ©. Province de la Nouvelle Écosse,  
2008. Peut être réimprimée avec la permission de Cancer Care  
Nova Scotia 1 866 599-2236

CNB 7645

Fiche d'information sur les médicaments

# CYCLOPHOSPHAMIDE I.V. (siklo-fos-fa-mi-de)

## Autres appellations de ce médicament :

Cytoxan<sup>MD</sup>, Procytox<sup>MD</sup> (Marque déposée)

## Présentation :

Injection : Solution transparente pour injection dans la circulation sanguine.

## Pourquoi devez-vous prendre ce médicament :

La cyclophosphamide est utilisée pour traiter le cancer du sein, des ovaires et des poumons, des lymphomes ainsi que d'autres types de cancer.

## Comment devez-vous prendre ce médicament :

Injection : La cyclophosphamide est injectée dans une veine par votre infirmière en chimiothérapie. Il est important que vous buviez beaucoup de liquides avant l'administration de la cyclophosphamide et que vous éliminiez beaucoup d'urine après.

New Brunswick  
Nouveau Brunswick