

Effets secondaires	Ce que vous devriez faire	Prévention
<p>Moins courants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raideur du cou • Maux de tête (généralement pendant une courte période seulement) • Fièvre 	<ul style="list-style-type: none"> • Si ces symptômes persistent pendant plus d'une journée après l'injection ou s'ils vous incommode, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Douleurs ou sensibilité à l'endroit de l'injection 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquez des compresses tièdes dans la région, pendant 15 ou 20 minutes, plusieurs fois par jour jusqu'à ce que la sensation d'inconfort disparaisse. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres 	<ul style="list-style-type: none"> • Dès que vous constatez la présence d'ulcérations dans votre bouche ou sur vos lèvres, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenez une bonne hygiène buccale. Brossez vous les dents souvent à l'aide d'une brosse à dents souple. Évitez de manger des aliments épicés, piquants ou acides.
<p>Rares :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signes d'infection, de fièvre, frissons, toux • Baisse du nombre de globules blancs 	<ul style="list-style-type: none"> • Ayez un thermomètre à la maison. Reconnaissez les signes d'infection. • Rendez vous directement à votre service d'urgence le plus près si votre température est supérieure à 38 °C ou 100 °F. Vous pourriez présenter une infection et avoir besoin d'antibiotiques. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limitez tout contact avec les personnes malades ou atteintes d'un rhume. Reposez vous souvent. Lavez vous souvent les mains.
<ul style="list-style-type: none"> • Nausées et vomissements 	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquez immédiatement avec votre médecin ou votre infirmière si les vomissements sont violents. 	<ul style="list-style-type: none"> • Votre médecin peut vous prescrire des médicaments contre les nausées et les vomissements. Continuez de boire des liquides clairs. Prenez de l'air et reposez vous.
<p>Très rares :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vision trouble • Confusion, convulsions, étourdissements • Fatigue ou faiblesse inhabituelles • Engourdissement des doigts et des orteils 	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquez avec votre médecin ou votre infirmière IMMÉDIATEMENT! 	

Précautions:

- Il importe d'indiquer à votre médecin si vous avez la varicelle (ou avez récemment été en contact avec une personne qui avait la varicelle), le zona, ou toute autre infection au moment de votre injection. Toutes ces situations pourraient influencer sur le traitement à la cytarabine.
- En raison du risque d'infection, communiquez avec votre médecin avant de recevoir tout vaccin.
- Si un médecin vous a conseillé de prendre de l'ASA (Aspirin^{MD}) afin de prévenir une maladie cardiaque ou les accidents vasculaires cérébraux, dites-le à votre oncologue avant d'entamer votre traitement contre le cancer. Autrement, NE PRENEZ PAS d'ASA pour soulager des douleurs et des maux quotidiens durant le traitement de chimiothérapie, prenez plutôt des produits contenant de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}).

(Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien si vos produits comportent de l'ASA ou de l'acétaminophène.)

Cette fiche d'information ne contient pas tous les renseignements connus sur ce médicament.

Pour de plus amples renseignements relativement à ce médicament, veuillez communiquer avec votre médecin, pharmacien ou infirmière.

(Numéro de téléphone de votre médecin ou infirmière)

Ou téléphonez au service
d'information de la Société canadienne
du cancer au
1 888 939-3333
ou consultez le
www.cancer.ca

Projet de collaboration du :
Programme de thérapie générale, Cancer Care Nova Scotia
Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick, division du ministère de
la Santé du Nouveau-Brunswick.

Approuvée par le Nova Scotia Cancer Patient Education
Committee
Visitez notre site Web au : www.cancercare.ns.ca

Droit d'auteur de la Couronne ©. Province de la Nouvelle Écosse,
2008. Peut être réimprimée avec la permission de Cancer Care
Nova Scotia 1 866 599-2236

Fiche d'information sur les médicaments

Intrathécal de CYTARABINE (intra-té-kal de si-ta-ra-bine)

Autres appellations de ce médicament :

Cytosar^{MD} (Marque déposée) Autres produits génériques disponibles

Présentation :

Injection : Solution transparente pour injection dans la moelle épinière.

Pourquoi devez-vous prendre ce médicament :

L'intrathécal de cytarabine est administré pour prévenir la croissance des cellules cancéreuses et éviter qu'elles forment des tumeurs importantes dans le crâne ou la moelle épinière. Ce médicament est administré conjointement à d'autres médicaments pour le traitement de certains types de leucémie.

Comment devez-vous prendre ce médicament :

Injection : L'intrathécal de cytarabine est injecté par votre médecin. Ce type d'injection est appelé ponction lombaire ou rachicentèse.