

Guide de lutte de contrôle des maladies pour le bleuets sauvage (2010)

Maladies	Nom commun	Produit	Taux du produit		Toxicité pour les abeilles	Délai avant la récolte (jours)	Commentaires (consultez les étiquettes pour plus d'information)
			kg ou L / ha	kg ou L / ac			
ANNÉE DE POUSSE							
Tache septorienne	chlorothalonil	Bravo 500	2,4 à 7,2 L/ha	1,0 à 2,9 L/ac	Nulle	Année de pousse seulement	Faire une application au début de juin. De faibles taux ont permis une bonne suppression de la maladie.
Rouille de la pruche	chlorothalonil	Bravo 500	4,8 à 7,2 L/ha	1,9 à 2,9 L/ac	Nulle	Année de pousse seulement	Faire une application à la fin de juillet. Le contrôle de la rouille de la pruche augmente le nombre de bourgeons à fruit.
Tache valdensinéenne	boscalid + pyraclostrobin	Pristine	1,3 à 1,6 kg/ha	0,53 à 0,65 kg/ac	Nulle	0	Appliquer au premier signe de maladie. Si le temps humide persiste, faire une deuxième application dans les 10 à 14 jours qui suivent.
ANNÉE DE RÉCOLTE							
Pourriture sclérotique	triforine	Funginex	1,7 L/ha	0,70 L/ac	Nulle	60	Les pulvérisations contre la pourriture sclérotique sont faites au début de l'éclatement des écailles de bourgeons (stade F2) et 7 à 10 jours plus tard si une deuxième application est nécessaire. Pas plus de deux applications par année. Aucune tolérance pour les bleuets exportés aux États-Unis pour le Funginex.
	propiconazole	Mission	0,3 L/ha	0,12 L/ac	Nulle	60	
		Propiconazole	0,5 L/ha	0,20 L/ac	Nulle	60	
		Topas	0,5 L/ha	0,20 L/ac	Nulle	60	
Moisissure grise	boscalid	Lance	0,56 kg/ha	0,23 kg/ac	Nulle	0	Les pulvérisations contre la moisissure grise sont faites au milieu et vers la fin de la floraison. Un temps humide avant et durant la floraison augmente le risque de moisissure grise. Les fongicides doivent être appliqués avant les périodes de temps humide pour prévenir l'infection.
	boscalid + pyraclostrobin	Pristine	1,3 à 1,6 kg/ha	0,53 à 0,65 kg/ac	Nulle	0	
	cyprodinil + fludioxonil	Switch	0,78 à 0,98 kg/ha	0,31 à 0,39 kg/ac	Nulle	1	
	fenhexamid	Elevate	1,70 kg/ha	0,69 kg/ac	Nulle	1	
Pourriture des fruits	Utiliser un des produits indiqués pour la moisissure grise		La pourriture des fruits est seulement un problème dans le cas des fruits vendus sur le marché frais. Appliquer les fongicides selon les instructions pour la moisissure grise. De plus, faire une application de fongicide avant la récolte pour éliminer la pourriture des fruits après la récolte.				
Tache septorienne	boscalid + pyraclostrobin	Pristine	1,3 à 1,6 kg/ha	0,53 à 0,65 kg/ac	Nulle	0	Faire une application à mi-floraison.
Tache valdensinéenne	boscalid + pyraclostrobin	Pristine	1,3 à 1,6 kg/ha	0,53 à 0,65 kg/ac	Nulle	0	Faire l'application au premier signe de maladie. Si le temps humide persiste, faire une deuxième application dans les 10 à 14 jours qui suivent.